

Fungicídna a insekticídna ochrana slnečnice, repy a strukovín



Vážení pestovatelia, spoločnosť AgroProtect® ako výhradným zástupca spoločnosti ADAMA na Slovensku nadväzuje na doposiaľ poskytovaný poradenský servis a ponuku širokého portfólia spoločnosti ADAMA Slovensko a prinášame vám aj túto sezónu okrem iného užitočný širokospektrálny fungicídny prípravok MIRADOR® UNI. Ideálny je pre fungicídne ošetrovanie dôležitých jarných plodín ako je slnečnica, repa cukrová, alebo strukoviny, ale aj minoritných, no rovnako dôležitých plodín z hľadiska osevného postupu.



MIRADOR® UNI – Univerzál na pohľadanie

Dvojzložkový systémový fungicíd, registrovaný do 12 plodín, ktorý rieši široké spektrum najdôležitejších hospodárskych chorôb. Jeho veľkou výhodou je registrácia v plodinách akými sú repa cukrová a krmná, slnečnica, repka ozimná a jarná, sója, pestrec mariánsky, repica olejnatá, ľanovník siaty, mak, ľan a konopa siatá.

- Obsahuje overené účinné látky:**
125 g/l azoxystrobin + 125 g/l difenoconazole
- Výhody použitia:**
- Výborný pomer ceny a účinku.
 - Rýchly príjem a akumulácia azolovej zložky vo voskovej vrstve.
 - Preventívny a kuratívny účinok.
 - Podpora tzv. Green efektu (zeleného efektu).
 - Môže sa aplikovať 2× počas vegetácie.

Ako intenzifikovať vaše porasty hrachu ozimného, jarného a sóje?

S postupným rozširovaním plôch sóje ako odpovede na drahé dusíkaté hnojivá, môže nastať situácia pestovania sóje po repke, slnečnici, maku alebo hrachu, kde sa vo väčšom rozsahu môžu vyskytovať choroby, ktoré dokážu výrazne znížiť úrodu a jej kvalitu. Podobne ako pri spomenutých plodinách, kde výskyt antraknózy dokáže znížiť očakávanú úrodu aj o 80 %. Vďaka overenému zelenému efektu, ktorý poskytuje prípravok MIRADOR® UNI prostredníctvom účinnej látky **azoxystrobin** a spolu s jeho širokým záberom proti dôležitým chorobám sóje (ako sú biela hniloba, antraknóza sóje a purpurová škvrnitosť sóje), môžete jednoduchým spôsobom intenzifikovať pestovanie tejto plodiny, t. j. zabezpečiť zvýšenie úrody a kvality produkcie s navýšením dusíkatých látok resp. bielkovín.

V ochrane slnečnice je MIRADOR® UNI registrovaný proti bielej hnilobe a hnedej škvrnitosti listov. Vo variante jedného ošetrovania aplikujte MIRADOR® UNI do rastového štádia, keď je kvetenstvo (úbor) oddelené od najmladších listov (BBCH 55). V prípade, ak sa pestovatelia rozhodnú vykonať 2 ošetrovania, odporúčame ho aplikovať do T1 vo fáze 14 – 20 listov kedy naplno využijete jeho preventívny a green efekt a následne do T2 v čase pred kvitnutím (BBCH 55), resp. prestriedať ho s účinnými látkami s odlišným mechanizmom účinku. Dávka: 1 l/ha.

Objavte kvalitu vo fungicídnej ochrane repy cukrovej!

V repe cukrovej a krmnej je MIRADOR® UNI registrovaný proti širokej škále dôležitých chorôb ako múčnatka repy, cercosporá, múčnatka a ramuláriová škvrnitosť v dávke 1 l/ha.

Dôležité je prípravok aplikovať preventívne, najneskôr však na začiatku rozvoja choroby, v rastovej fáze BBCH 39 (listy pokrývajú 90 % pôdy) do fázy BBCH 45 (koreň repy dosiahol 50 % svojej veľkosti). Prípravok aplikujte max. 1×, preventívne alebo pri prvých príznakoch choroby. Pri neskorom zbere repy, pri ktorom sa plánujú 2 fungicídne vstupy, MIRADOR® UNI odporúčame aplikovať do T1 (prvého fungicídneho vstupu).

SPYRALE® – jediné antirezistentné riešenie pre T2 a T3 aplikácie

100 g/l difenoconazole + 375 g/l fenpropidin je kombinovaný širokospektrálny systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom proti cercospóre a múčnatke repy. V NL reg. aj proti hrdzi a ramulárovej škvrnitosti.

Termín aplikácie: Prípravok SPYRALE® aplikujte proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy krmnej preventívne, resp. pri zaznamenaní prvých príznakov napadnutia, od rastovej fázy začiatku zapájania porastov: od 10 % rastlín v riadku zapojených (BBCH 31) do fázy, keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 49).

Razantná insekticídna ochrana repy a strukovín



PIRIMOR® 50 WG (pirimicarb) je selektívny insekticíd špeciálne vyvinutý proti všetkým druhom vošiek s rýchlym knock-down efektom, pričom užitočný hmyz nie je poškodzovaný. Má kontaktný a požerový účinok. Vďaka fumigačnému účinku úspešne likviduje aj vošky, ktoré nie sú postrekom priamo zasiahnuté. Registrovaný v mnohých poľných, záhradných, okrasných či lesných kultúrach. V repe cukrovej a krmnej aplikujte v dávke 0,2 kg. Proti voške hrachovej v hrachu a voškám v bôbe a fazuli aplikujte 0,3 – 0,5 kg/ha. V maku proti voške makovej aplikujte PIRIMOR® 50 WG v dávke 0,3 – 0,5 kg/ha.

MAVRIK® je bór kompatibilná formulácia kontaktného insekticídu na báze unikátneho pyretroidu (tau-fluvalinate). Je povolený aj proti roztočcovi chmeľovému v repe cukrovej a sóji v dávke 0,2 – 0,3 l/ha, je spoľahlivý aj za vysokých teplôt (nad 25 °C). Prípravok má silný kontaktný a fumigačný účinok.

Použitie tvrdej vody môže znížiť účinnosť prípravkov na ochranu rastlín, resp. ich kompatibilitu

s hnojivami. V takomto prípade odporúčame aplikovať našu pomocnú látku ADAPTIC v dávke 0,2 – 0,5 l/ha, ktorým sa upraví tvrdosť a pH aplikačnej kvapaliny. Následne pridáme insekticíd MAVRIK® a až po jeho dôkladnom premiešaní pridáme hnojivo.

Aktuálne informácie získate na www.adama.com, v našej Mobilnej aplikácii ADAMA SK Katalóg alebo môžete kontaktovať náš skúsený Technicko-poradenský servis.

Ing. DALIBOR BÁTI a tím spoločnosti AgroProtect®



Ako prevenciu bielej hniloby a ďalších chorôb sóje aplikujte MIRADOR UNI v dávke 1 l/ha vo fáze tesne pred kvitnutím až do plného kvetu.

Menej významné použitia fungicídu MIRADOR®-u UNI

Prípravok	Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka/ha	OD
MIRADOR UNI	pestrec mariánsky	hubové choroby	1 l	AT
	repa krmná	hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť repy, múčnatka repová	1 l	35 dní
	repica olejnatá	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť	1 l	AT
	ľanovník siaty	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť	1 l	AT
	kapusta sitinová	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesň belostná	1 l	AT
	mak	biela hniloba, múčnatka stavikrlová, alternáriová škvrnitosť	1 l	AT
	horčica	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesň belostná	1 l	AT
	ľan	biela hniloba, hrdza ľanová, čiern ľanu	1 l	AT
	konope	biela hniloba	1 l	AT, na vlákno
	sója	biela hniloba, antraknóza sóje, purpurová škvrnitosť sóje	1 l	AT



Biela hniloba je jednou z najzávažnejších chorôb slnečnice. V rokoch silného výskytu môže spôsobiť straty na úrode 30 – 50 %.



V ochrane maku aplikujte MIRADOR® UNI v dávke 1 l/ha preventívne alebo najneskôr na začiatku infekcie bielej hniloby, múčnatky, či alternárie od rastovej fázy, keď sú prvé korunné lupienky viditeľné do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 59-69).



Proti cercospóre začnite aplikovať koncom júla, keďže fungicídna ochrana v počiatočnej fáze napadnutia je najúčinnnejšia.