

Jesenné ošetrovanie repky olejnej so spoločnosťou AgroProtect®



Vážení pestovatelia, pomaly končí zber porastov repky olejnej a s radosťou môžeme konštatovať, že úrody vo všetkých regiónoch Slovenska sú nadpriemerné. Hoci počas celej pestovateľskej sezóny museli vzdorovať rôznym klimatickým nástrahám, ani tento rok repka svojich pestovateľov nesklamala, aj cena je zaujímavá. Takže repka olejná zostáva pevne zakotvená v oševných postupoch – a to najmä z hľadiska výbornej predplodínovej hodnoty, ale aj jej profitability. Oševné plochy zostanú pravdepodobne aj túto jeseň viac-menej konštantné. Repka ozimná olejná je na začiatku svojho rastu konkurenčne slabou plodinou, takže štart bez burín a škodcov tvorí základ pre jej úspešné pestovanie.



DINASTIA 5 I + ADAPTIC 10 L PACK Využite zľavu 5 % na balík určený pre dôkladné insekticídne ošetrovanie 35 ha

Jesenné herbicídne ošetrovanie tvorí základ pre jej úspešné pestovanie. Spoločnosť **AgroProtect®** ponúka na prvý dôležitý krok prípravky s osvedčenými a spoľahlivými účinnými látkami metazachlór a quinmerac – **SULTAN 50 SC** a **SULTAN TOP**. Na graminicídne ošetrovanie môžeme použiť špičkový graminicíd **AGIL 100 EC** a na insekticídne ošetrovanie širokospektrálny pyretroid **DINASTIA**.

SULTAN TOP je 2 zložkový herbicíd s vysokým obsahom dvoch účinných látok, ktoré tvoria základ herbicídnej ochrany repky olejnej. Je určený na PRE ale aj skorú POST aplikáciu. Účinná látka (metazachlór 375 g/l) je prijímaná klíčovými burinami, najmä hypokotylom a koreňmi, po vzídení burín čiastočne listami. Účinná látka (quinmerac 125 g/l) je prijímaná predovšetkým koreňmi a z časti taktiež listami burín a zabezpečí výbornú účinnosť na lipkavec obyčajný.

SULTAN 50 SC je herbicíd so sólo účinnou látkou metazachlór, určený na PRE a skorú POST aplikáciu. Pre pestovateľov hospodáriacich vo vodohospodársky chránených územiach odporúčame použiť na základné herbicídne ošetrovanie **SULTAN 50 SC**, ktorý je tu povolený. Účinná látka (metazachlór 500 g/l) je prijímaná predovšetkým hypokotylom a koreňmi klíčiacich burín, po vzídení čiastočne listami. Dávka je 1,5 – 2 l/ha.

Naše odporúčanie: na zlepšenie účinku prípravku **SULTAN 50 SC** a **SULTAN TOP** je vhodný TM s pomocnou látkou **GROUNDED**. Pôdna pomocná látka je špeciálne vyvinutá na aplikáciu s pôdnymi herbicídmi. V aplikačnej zmesi výrazne znižuje úlet postrekovej kvapaliny, predlžuje a zvyšuje účinnosť použitého prípravku (najmä počas suchého počasia), zlepšuje pokrytie pôdy herbicídnym filmom a bráni splavovaniu herbicídu mimo aktívnej zóny. Do aplikačnej kvapaliny sa pridáva ako druhá. Dávka 0,2 – 0,4 l/ha.

Graminicídne ošetrovanie porastov repky olejnej ozimnej patrí taktiež medzi nevyhnutné zásahy. Dôležité je ich čo najskôr ošetriť proti výmrvu obilnín, výmrvu jačmeňa jarného a ovsu je veľmi agresívny a nutná je skorá aplikácia graminicídu.

AGIL 100 EC (100 g/l *propanilazafop*) je originálny graminicíd s výborným účinkom na jednoročné a trváce jednoklíčnolistové buriny. Jeho prednosťou je rýchly účinok – trávovité buriny po zasiahnutí prípravkom už po 1 – 2

SULTAN TOP 40 I + GROUNDED 5 I PACK

Využite zľavu 5 % na nový technologický balík obsahujúci komplexný 2-zložkový PRE/EPOST herbicíd s pôdnym zmáčadlom pre istejší a dlhodobý účinok určený na ošetrovanie 20 ha repky.

SULTAN 50 SC 40 I + GROUNDED 5 I PACK

Využite zľavu 5 % na nákup technologického balíka s obsahom základného PRE/EPOST herbicídu pre sólo herbicídny zásah ako aj flexibilného TM partnera spolu s pôdnym zmáčadlom pre istejšiu a dlhodobú ochranu 20 ha repky.

dňoch zastavujú svoj rast a vývoj, čo zabezpečuje rýchly prienik účinnej látky do pletív a jej rýchlu translokáciu v rastline. Formulácia obsahuje silné zmáčadlo, dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinnosť prípravku. Účinnosť graminicídu **AGIL 100 EC** nie je ovplyvnená druhom a vlhkosťou pôdy. Prednosťou graminicídu **AGIL 100 EC** je absolútna selektivita voči repke olejnej ozimnej, preto je ho možné aplikovať v akejkoľvek rastovej fáze repky – aj na vzhádzajúcu repku.

Naše odporúčanie: Pri silnom výskyte výmrvu obilnín je vhodné použiť delenú aplikáciu 0,35 – 0,4 l/ha a následne o 2 – 3 týždne ďalšiu aplikáciu. Ošetrovanie treba vykonať hneď po vykľincovaní výmrvu. Delená aplikácia graminicídu zabezpečí porast repky bez trávovitých burín.

Insekticídne ošetrovanie patrí taktiež k nevyhnutným jesenným zásahom.

DINASTIA (deltametrin 50 g/l) je širokospektrálny kontaktný a požerový insekticíd zo skupiny pyretroidov so širokým použitím. Vyznačuje sa spoľahlivým účinkom, širokým aplikačným oknom a vynikajúcim pomerom ceny a účinku.

Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín, najlepšie zvýšením tlaku postrekovača resp. použitím podpory vzduchu v prípade, že sa škodca nachádza na spodnej strane listov. Proti piliarke repkovej a skočkám ošetríte od vzhádzania do konca októbra. Proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu repky. Dávka je 0,15 l/ha v 200 – 400 l vody/ha. Pre lepšie pôsobenie pyretroidu **DINASTIA** použite TM s adjuvantom **ADAPTIC**, ktorý je určený pre zlepšenie vlastností aplikačných kvapalín. Znižuje pH a tvrdosť vody, má protipenivý účinok, redukuje úlet a odpar a optimalizuje zachytenie postreku na cieľovom povrchu.



Porast vhodný na delenú aplikáciu graminicídu



Rýchly nástup účinku graminicídu **AGIL 100 EC**



Základom pri **SULTAN-e TOP** je PRE aplikácia do 3 dní po sejbe pred vzídením repky a burín. Aplikačné okno počas sucha možno predĺžiť, pričom buriny by mali byť v štádiu klíčnych až 1. páru pravých listov. Dávka herbicídu je 1,75 – 2 l/ha, na ľahších pôdach použite spodnú hranicu dávky a na stredných a ťažkých pôdach zvýšte dávku na 2 l/ha.



Absolútna bezpečnosť pre vzhádzajúcu repku je pre oba prípravky **SULTAN 50 SC** a **SULTAN TOP** samozrejmosťou.

Odporúčané dávkovanie graminicídu Agil 100 EC v závislosti od druhu a rastovej fázy trávovitých burín		
pýr plazivý	1,0 l/ha	1,5 l/ha
výmrv obilnín	0,4 l/ha	0,5 l/ha
pslarka roľná	0,5 l/ha	1,0 l/ha
ovos hluchý	1,0 l/ha	1,2 l/ha
ježatka kurla	0,7 l/ha	1,0 l/ha